Vol. 17, No. 2 Maret 2011

ISSN 0854-4263

INDONESIAN JOURNAL OF

Clinical Pathology and Medical Laboratory

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

IJCP & ML (Maj. Pat. Klin. Indonesia & Lab. Med.)	Vol. 17	No. 2	Hal. 57-126	Surabaya Maret 2011	ISSN 0854-4263
---	---------	-------	-------------	------------------------	-------------------

Diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia

Published by Indonesian Association of Clinical Pathologists

Terakreditasi No: 43/DIKTI/Kep/2008, Tanggal 8 Juli 2008

INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

DAFTAR ISI

PENELITIAN

- Pemberian Protein Adhesin 38-kilodalton ***Mycobacterium Tuberculosis*** Peroral Meningkatkan Jumlah Makrofag dan Limfosit Usus Mencit Balb/c
(*Oral Administration of Mycobacterium Tuberculosis 38-kilodalton Adhesin Protein Increases Macrophages and Lymphocytes in Intestinal Balb/c Mice*)
Rahma Triliana, Ade A Kartosen, Dianika P Puspitasari, Sri Murwani, Sanarto Santoso, Maimun Z Arthamin 57-62
- Diazo Test as a Screening Test of Typhoid Fever: A Practical Approach
(*Uji Diazo sebagai Penyaring Demam Tifoid; Sebuah Pendekatan Praktis*)
J. Nugraha, Meiti Muljanti 63-66
- The Diagnostic Value of Heart-type Fatty Acid Binding Protein (h-FABP) Rapid Test Related to Cardiac Troponin I in Non ST Elevation Myocardial Infarction (Nstemi)
(*Nilai Diagnostik Uji Cepat Heart Type Fatty Acid Binding (h-FABP) Dihubungkan dengan Troponin I pada Non ST Elevation Myocardial Infarction (Nstemi)*)
E.R. Marpaung, Aryati, Sidarti Soehita SFHS, Yogiarto, Yusri 67-71
- Kadar Serum Kreatinin dan Kalium Pasien dengan dan Tanpa Diabetes Jenis (Tipe) II
(*The Creatinine Level and Potassium Serum in Patients with and without Type II Diabetic*)
Tonang Dwi Ardyanto, Tahono 72-75
- Prokalsitonin sebagai Penanda Pembeda Infeksi Bakteri dan Non Bakteri
(*Procalcitonin for the Differentiation of Bacterial and Non Bacterial Infection*)
Bastiana, Aryati, Dominicus Husada, MY. Probahoeso 76-80
- Diagnosis Jangkitan (Infeksi) Virus Dengue dengan Uji Cepat (*Rapid Test*) IgA Anti-dengue
(*Diagnosis of Dengue Virus Infection with IgA Anti Dengue Rapid Tests*)
Sri Kartika Sari, Aryati 81-85
- Status Penggumpalan (Agregasi) Trombosit sebagai Faktor Prognostik Terjadinya Keluaran Klinis Strok Infark Mendadak (Strok Infark Akut)
(*The Platelet Aggregation Test as a Predictor of Clinical Outcome in Acute Infarction Stroke*)
Linda Rosita, Usi Sukorini, Budi Mulyono 86-96
- Hubungan antara *Flagging Atypdep* di Alat Cell-DYN 3200 dan Keberadaan *Plasmodium Spp* di dalam Darah Penderita di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
(*Association Between Atypical Depolarization on the Cell-DYN 3200 and the Presence of Plasmodium Spp in Blood in the Dr. Soetomo Hospital Surabaya*)
Esti Rohani, J. Nugraha 97-101
- Korelasi antara Hitung Trombosit dengan Jumlah Cd4 Pasien HIV/AIDS
(*The Correlation between Thrombocyte and Cd4 Count in HIV/AIDS Patients*)
M.I. Diah Pramudianti, Tahono 102-106
- Pengaruh (Efek) Kemoterapi terhadap Kerja (Aktivitas) Enzim Transaminase di Penderita Kanker Payudara
(*The Chemotherapy Effect in the Activity of Transaminase Enzymes in Breast Cancer Patients*)
Helena Leppong, Mutmainnah, Ulang Bahrin 107-109

TELAAH PUSTAKA

Patogenesis dan Pemeriksaan Laboratoprium Mielofibrosis Primer (<i>Pathogenesis and Laboratory Examination of Primary Myelofibrosis</i>) Johanis, Arifoel Hajat	110–120
--	----------------

LAPORAN KASUS

Leukositosis Ber- <i>flagging</i> Bintang (*) Berpotensi Adanya Interferensi Alat Analisis Hematologi Otomatis (<i>Star (*)-flagged Leukocytosis as Indicator of Interfering Factor in Automatic Hematology Analyzer</i>) Christine Sugiarto, Leni Lismayanti, Nadjwa Zamalek Dalimoenthe	121–124
--	----------------

INFORMASI LABORATORIUM MEDIK TERBARU	125–126
--	----------------

KADAR SERUM KREATININ DAN KALIUM PASIEN DENGAN DAN TANPA DIABETES JENIS (TIPE) II

(The Creatinine Level and Potassium Serum in Patients with and without Type II Diabetic)

Tonang Dwi Ardyanto, Tahono

ABSTRACT

Hyperkalemia is a metabolic disorder caused by either renal insufficiency for potassium excretion (like in renal failure), the dysmechanism of potassium transportation into the intracellular space (regards on the hyperglycemia status) or combinations of those etiologies. In nephropathy diabetic patients, hyporeninemic hypoaldosteronism syndrome might also be the etiology resulting from the high potassium level. The objective of the present study was to evaluate the correlation between the serum creatinine and potassium level in patient with and without type II diabetes. The data of this study were drawn from patients admitted to the laboratory for the measurement of serum creatinine and potassium with or without the measurement of blood glucose level at the Clinical Pathology Laboratory of Moewardi Hospital in Surakarta. The subjects were then classified into two groups: A (non-diabetic patients) and B (diabetic patients). The data were analyzed statistically with T-student test and Pearson Correlation test based on the total samples, per each group (A and B groups) and the diabetic status (only B group) one. In this study so far it was found that the serum creatinine and potassium level were significantly correlated in the total sample and group A analysis ($p < 0.05$). Surprisingly, the correlation was not found or very weak in group B ($p > 0.05$). Furthermore, no correlation was found in the analysis based on the diabetic status among the B group subjects ($p > 0.05$). It can be suggested that other factors may play a significant influence on the correlation between the hyperglycemia state, renal failure and serum potassium level in diabetic patients. Further detailed analysis should be warranted to elucidate those factors.

Key words: Diabetic type II, creatinine level, potassium level

ABSTRAK

Hiperkalemia merupakan masalah metabolik akibat ketidakmampuan ginjal mengeluarkan kalium, yaitu gangguan mekanisme yang memindahkan kalium dari peredaran (sirkulasi) ke dalam sel, atau gabungan faktor tersebut. Di pasien dengan penyakit ginjal nefropati diabetika, kadar tinggi kalium darah (hiperkalemia) dapat disebabkan oleh sindroma hiporeninemik hipoadosteronisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antar kadar kreatinin dan kalium di pasien dengan dan tanpa diabetes. Data penelitian ini diperoleh dari pasien yang memeriksakan kadar kreatinin dan serum kalium yang disertai atau tanpa pemeriksaan kadar glukosa darah di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Dr Moewardi selama bulan Januari 2010. Pasien dikelompokkan menjadi kelompok A (tanpa diabetes) dan B (dengan diabetes). Data dianalisis secara statistik (uji t dan dengan kenasaban Pearson). Kadar kreatinin dengan kadar kalium berhubungan kuat, secara keseluruhan data maupun di kelompok A ($p < 0,005$). Namun, hubungannya tidak ada atau sangat lemah dan bersifat negatif di kelompok B ($p > 0,05$). Diduga ada faktor lain yang mengaburkan pengaruh hiperglikemia dan penurunan fungsi ginjal terhadap kadar kalium di kelompok B. Terdapat hubungan antara kadar kreatinin dan kalium serum dalam keadaan nondiabetik. Hubungan tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk pengujian dalam keadaan diabetik.

Kata kunci: Kadar(level) kalium, kreatinin, diabetes jenis II

PENDAHULUAN

Hiperkalemia adalah keadaan kadar kalium dalam darah melebihi ambang, yaitu $> 5,5$ mmol/L. Jumlah penderita pengidap hiperkalemia yang dirawat inap antara 1–10%. Meskipun angka pasti pada pelayanan kesehatan di masyarakat tidak diketahui, tetapi peningkatan kadar kalium sering menjadi masalah yang berkemungkinan mengancam jiwa penderita, terutama mereka yang gagal ginjal menahun atau penyakit lain yang menurunkan tingkat pengeluaran

kalium di ginjal. Di kelompok kedua ini, hiperkalemia sering dipicu oleh tekanan (stresor) seperti keadaan sakit, dehidrasi, atau pemberian obat yang mengubah homeostasis kalium.¹

Di tubuh manusia, kadar kalium sebanding dengan 53,8 mmol/kgBB. Sekitar 10% di antaranya berada dalam cairan luar sel (ekstraseluler), sedangkan 90% lainnya di cairan dalam sel (intraseluler). Dari 10% tersebut, hanya 2% yang terlarut dalam ekstraseluler, sedangkan 8% lainnya berada dalam tulang. Karena sebaran yang tidak simetris, maka pergerakan kecil

diantara bagian dalam sel (kompartemen intraseluler) dan ekstraseluler menimbulkan perubahan besar terhadap kadar kalium dalam serum. Di orang dewasa yang sehat, kadar kalium dipertahankan secara ketat dalam rentang sempit 3,5–5,0 mmol/L, berapapun asupan (*intake*) kaliumnya. Hal ini dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara jumlah asupan dan jumlah yang dikeluarkan melalui ginjal dan traktus intestinalis, serta keseimbangan antara kadar intra dan ekstra seluler.^{2–5}

Beberapa faktor dapat menjadi penyebab. Langkah pertama dalam menilai pasien/penderita dengan peningkatan kadar kalium adalah menyingkirkan kemungkinan peningkatan yang bersifat semu atau palsu (akibat kesalahan terkait pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium maupun faktor genetik). Bila peningkatan tersebut terbukti memang nyata, ada tiga (3) alternatif penyebab: pengaruh pemberian pengobatan, termasuk peningkatan asupan kalium (tabel 2); gangguan sebaran kalium antara ruang intraseluler dan ekstraseluler; atau gangguan pengeluaran kalium di ginjal. Ketiga faktor ini sering terjadi bersama-sama (misalnya, terjadi tekanan (*stress*) akibat penyakit tertentu yang mengimbas kalium hiperkalemia di pasien/penderita yang sebenarnya sudah rentan karena mengalami gangguan mekanisme homeostatis disertai pemberian pengobatan yang mengganggu regulasi kalium normal.¹

Secara progresif, semakin tinggi kadar glukosa serum berhubungan dengan semakin tingginya kadar kalium. Hiperglikemia menimbulkan berbagai pengaruh terhadap kadar kalium serum. Kekurangan insulin menyebabkan translokasi kalium intraseluler ke bagian luar sel (kompartemen ekstraseluler). Kadar insulin serum yang diperlukan untuk mendorong masuknya kalium ke dalam sel lebih rendah daripada yang diperlukan untuk penerimaan (*uptake*) karbohidrat. Pengaruh kedua dari hiperglikemia adalah akibat hipertonisitas, yang juga memicu pergerakan kalium dari intra seluler ke ekstraseluler. Hal ini dilaporkan sebagai penyebab hiperglikemia dalam keadaan terjadi peningkatan kadar glukosa serum secara cepat.³

METODE

Subyek

Penelitian ini merupakan amatan (observasional) analitik. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pemeriksaan kadar kalium dan kreatinin pasien/penderita dengan dan tanpa diabetes di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Dr Moewardi selama 1–31 pada Januari 2010. Patokan kelompok tanpa diabetes (kelompok A) adalah pasien/penderita yang

memeriksa kadar kreatinin dan kalium serum pada waktu bersamaan, dan dalam riwayat mengendalikan secara berkala kadar glukosa darah berturut-turut catatan medik dan data elektronik di laboratorium PK RSUD dr Moewardi. Patokan kelompok dengan diabetes (kelompok B) adalah pasien/penderita yang memeriksa kadar glukosa darah, kreatinin dan kalium secara bersamaan pada satu waktu, dan dalam riwayatnya mengendalikan secara berkala kadar glukosa darah berturut-turut minimal tiga kali selama 6 bulan terakhir berdasarkan catatan medik dan data elektronik di laboratorium Patologi Klinik RSUD dr Moewardi. Seluruh subyek, dipilih sebanyak 80 pasien/penderita di setiap kelompok secara acak berurutan (*consecutive random*).⁴

Analisis Data

Data bersifat sekunder, diambil secara *cross-sectional* (potong lintang) berupa hasil ukuran kadar kreatinin dan kalium serum (kelompok A), dan dengan hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dengan/tanpa kadar glukosa darah 2 jam pascamakan/*post-prandial* (kelompok B). Tahap pertama, hubungan antara kadar kreatinin dan kalium serum diuji dalam keseluruhan data dari kedua kelompok. Tahap kedua, hubungan tersebut diuji di setiap kelompok. Hubungan antar variabel diuji dengan Uji kenasaban Pearson, pada taraf kemaknaan 95% ($p < 0,05$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerian terokan (Deskripsi sampel)

Sebaran setiap tolok ukur relatif beragam. Data hasil ukuran 2 jam pascamakan tidak didapatkan di semua sampel, karena relatif banyak pasien yang hanya memberikan sampel glukosa darah puasa, tetapi tidak datang untuk sampel glukosa darah 2 jam pascamakan. Sebaran yang relatif beragam ini, diharapkan hasil analisis akan memiliki kekuatan andaian patokan (hipotetik). Ternyata rerata kadar kreatinin di kelompok B justru lebih rendah daripada kelompok A ($p < 0,035$). Begitu juga dengan kadar kalium serumnya ($p < 0,018$). Apakah ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan pasien diabetes melitus, perlu dikaji tersendiri.

Hubungan antara kadar kalium dan kreatinin serum

Analisis terhadap keseluruhan data (160 pasien), tanpa melihat status diabetiknya, didapatkan hasil kekuatan hubungan $r = 0,579$ ($p < 0,005$) (tabel 2). Hal ini mendukung kajian pustaka bahwa fungsi ginjal yang digambarkan oleh kadar kreatinin

Tabel 1. Deskripsi sebaran data

Tolok ukur	Kelompok A			Kelompok B			P
	N	Rerata $\pm$ SD	Rentang	N	Rerata $\pm$ SD	Rentang	
Kreatinin	80	3,71 $\pm$ 5,41	0,2–23,8	80	4,61 $\pm$ 6,58	0,2–16,7	0,035
Kalium	80	4,45 $\pm$ 1,35	2,1–9,1	80	3,74 $\pm$ 0,839,1	2,1–6,2	0,018
GDP				80	135,50 $\pm$ 66,15	64–373	
GD2JPP				29	174,00 $\pm$ 90,13	93–413	

serum, berpengaruh bermakna terhadap kadar kalium serum. Kekuatan hubungannya memang sedang ($r<7,5$), tetapi secara statistik bermakna.

Patokan kreatinin serum ≥ 2 mg/dL, ternyata kekuatan hubungan yang ditunjukkan justru lebih rendah ($r=0,499$; $p<0,005$). Karena perhitungan ini mencakup keseluruhan data, maka faktor adanya diabetes di kelompok B, diduga yang menurunkan kekuatan hubungan tersebut. Keadaan kekurangan insulin maupun kecenderungan hipertonisitas, secara teoritis, mengarah ke kadar kalium yang lebih tinggi. Hasil ini memang tidak sesuai dengan laporan Takaichi *et al.*² yang menyatakan bahwa kadar kalium di kelompok diabetes cenderung lebih tinggi daripada kelompok non-diabetik. Salah satu perbedaan dengan laporan tersebut adalah, batasan patokan subyek dengan kadar kreatinin <5 mg/dL. Sementara pada penelitian ini, kadar kreatinin serum tidak dibatasi (antara 0,2–23,8 mg/dL).

Di analisis secara terpisah menurut kelompok, di kelompok A (non-diabetik), menghasilkan hubungan antara kalium dan kreatinin serum yang lebih kuat ($r=0,758$; $p<0,01$; tabel 2). Dalam hal ini terlihat bahwa dengan tidak adanya pengaruh keadaan diabetik (kelompok B), hubungan antara kadar kreatinin dan kalium serum lebih kuat. Sebagaimana kajian teoritis, dalam keadaan tanpa diabetes, cenderung faktor pengeluaran kalium di ginjal yang paling dominan yang menentukan kadar kalium serum. Hasil ini sesuai dengan laporan Takaichi *et al.*²

Tabel 2. Hasil analisis hubungan antara kadar kreatinin dan kalium serum keseluruhan jumlah sampel, setiap kelompok dan kadar kreatinin tertentu

Kelompok	N	r (Pearson)	P
Keseluruhan jumlah	160	0,579	$<0,05$
Kreatinin <2 mg/dL	107	0,231	0,017
Kreatinin ≥ 2 mg/dL	53	0,499	$<0,05$
Kelompok A	80	0,758	$<0,05$
Kreatinin <2 mg/dL	50	0,341	0,015
Kreatinin ≥ 2 mg/dL	30	0,632	$<0,05$
Kelompok B	80	0,017	0,884
Kreatinin <2 mg/dL	57	0,139	0,304
Kreatinin ≥ 2 mg/dL	23	-0,180	0,412

Patokan kreatinin serum ≥ 2 mg/dL menunjukkan kekuatan hubungan yang lebih rendah ($r=0,632$;

$p<0,05$). Padahal analisis ini tidak mencakup data dari sampel kelompok diabetes. Berarti, pengaruh kekurangan insulin dan hipertonisitas yang terkait diabetes, dapat disingkirkan. Kemungkinan secara klinis, ada penurunan fungsi ginjal ditunjukkan oleh peningkatan kadar serum kreatinin, yang juga disertai perubahan pertukaran zat organik tubuh (metabolik) lain. Hal tersebut berpengaruh terhadap kadar kalium serum, yang tidak berkaitan dengan kemungkinan diabetes. Perubahan tersebut misalnya akibat: pemberian obat golongan penghambat (inhibitor) ACE atau ARB (untuk perbaikan hipofungsi ginjal atau dalam keadaan tekanan darah tinggi), penurunan tekanan osmotik dan onkotik darah (misalnya karena perubahan kadar albumin) atau adanya pengaruh asupan kalium. Salah satu kemungkinan lain adalah bahaya secara statistik karena jumlah sampel yang memenuhi patokan tersebut relatif kecil ($n=30$).

Analisis terhadap kelompok B, menunjukkan bahwa hubungan antara kadar serum kreatinin dan kalium ($r=-0,017$; $p>0,05$) tidak ada atau sangat lemah. Bila kelompok dengan patokan serum kreatinin ≥ 2 mg/dL diambil, maka kekuatan hubungan sedikit meningkat ($r=-0,180$; $p>0,05$). Kekuatan hubungan itu, bila memang dianggap ada, bersifat negatif. Artinya, penurunan fungsi ginjal (digambarkan oleh kadar serum kreatinin) dalam keadaan diabetes justru berbanding terbalik dengan penurunan kadar serum kalium. Hal ini tidak mudah dijelaskan, mengingat secara teoritis, paduan antara penurunan fungsi ginjal, kekurangan insulin dan kecenderungan hipertonisitas, seharusnya mengarah ke peningkatan kadar kalium. Kedua pengaruh tersebut, timbul dalam keadaan hiperglikemia.

Hubungan kadar glukosa darah puasa dan kalium pasien/penderita diabetes

Secara progresif, peningkatan kadar glukosa akan diikuti oleh peningkatan kadar kalium, karena penarikan ion H^+ ke intra-seluler akan memaksa pergerakan K^+ ke ekstraseluler. Namun, analisis hubungan antara kadar glukosa darah puasa dan kadar kalium menunjukkan kekuatan hubungan yang juga negatif dan tidak bermakna ($r=-0,146$; $p>0,05$) (tabel 3). Kajian kepustakaan memang menyebutkan, bahwa keadaan hiperglikemia yang berkaitan dengan gagal ginjal menahun, keeratan hubungan antara

kadar glukosa darah dan kalium tidak selalu terlihat nyata.

Tabel 3. Hubungan antara kadar glukosa darah puasa dan kalium serum di kelompok B secara keseluruhan jumlah dan kadar kreatinin tertentu

Kelompok	N	R	p
Keseluruhan jumlah	80	-0,148	0,191
Kreatinin <2 mg/dL	57	-0,214	0,11
Kreatinin ≥2 mg/dL	26	-0,104	0,636

Hal ini didukung analisis data lebih lanjut. Di Tabel 4 ditunjukkan hubungan antara kadar serum kreatinin dan kalium subyek kelompok B yang dikelompokkan menurut tingkat kendalian diabetesnya.⁸ Secara teoritis diduga bahwa kadar kalium serum akan meningkat, sesuai dengan peningkatan kadar glukosa darah beserta penyulit (komplikasi) nefropati diabetik yang ditimbulkannya. Namun, data di tabel 4 tidak menunjukkan hubungan di antara keduanya. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa hubungan antara kadar serum kreatinin dan kalium dalam keadaan diabetes, dikaburkan oleh keadaan sistemis akibat penyakit tersebut.

Tabel 4. Hubungan antara kadar serum kreatinin dan kalium di kelompok B menurut tingkat kendalian diabetes

Kelompok	N	r	p
Keseluruhan jumlah	80	0,017	0,884
Terkontrol baik	31	0,020	0,914
Terkontrol sedang	15	0,215	0,441
Terkontrol buruk	34	0,099	0,579

SIMPULAN

Pada penelitian ini didapatkan hubungan antara kadar kreatinin dan kalium di keadaan nondiabetik. Dalam keadaan diabetik, hubungan tersebut tidak didapatkan. Ada beberapa faktor lain, yang bersifat faktor ganda diduga mengaburkan hubungan serum kreatinin dan kalium tersebut. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut dengan sampel yang lebih mewakili/representatif (jumlah dan keragamannya) untuk menelusuri faktor tersebut lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Joyce CH and James FC, Hyperkalemia, Am Fam Physician 2006; 73: 283–90.
2. Takaichi K, Takemoto F, Ubara Y and Mori Y, Analysis of Factors Causing Hyperkalemia, 210.2169/internalmedicine.46.6415, 2007 The Japanese Society of Internal Medicine, 2007; 46(12): 823–829.
3. Franciszek K, Lidia HK. Drug induced abnormalities of potassium Metabolism, Polskie archiwum medycyny wewnetrznej 2008; 118 (7–8).
4. Fiona EK. Mechanisms in Hyperkalemic Renal Tubular Acidosis. J.Am Soc Nephrol 2009; 20: 251–254.
5. Olivier M, Marc F, Jerome R et al. timing of Onset of CKD-Related Metabolic Complications, J.Am Soc Nephrol 2009; 20: 164–171.
6. Antonios HT, Todd S, Kostas CS et al., Pathophysiology and Management of Fluid and Electrolyte Disturbances in Patients on Chronic Dialysis with Severe Hyperglycemia, Seminars in Dialysis—Vol 21, No 5 (September–October) 2008; 431–439.
7. Sastroasmoro S. Pemilihan Subyek Penelitian dalam Sastroasmoro S dan Ismael S. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis, Edisi 3, Jakarta, Sagung Seto, 2008; 78–91.
8. Perhimpunan Endokrinologi Indonesia, Konsensus Pengendalian Diabetes Melitus, Jakarta, PB Perkeni, 2006.