Vol. 17, No. 2 Maret 2011

ISSN 0854-4263

INDONESIAN JOURNAL OF

Clinical Pathology and Medical Laboratory

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

IJCP & ML (Maj. Pat. Klin. Indonesia & Lab. Med.)	Vol. 17	No. 2	Hal. 57-126	Surabaya Maret 2011	ISSN 0854-4263
---	---------	-------	-------------	------------------------	-------------------

Diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia

Published by Indonesian Association of Clinical Pathologists

Terakreditasi No: 43/DIKTI/Kep/2008, Tanggal 8 Juli 2008

INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY

Majalah Patologi Klinik Indonesia dan Laboratorium Medik

DAFTAR ISI

PENELITIAN

- Pemberian Protein Adhesin 38-kilodalton ***Mycobacterium Tuberculosis*** Peroral Meningkatkan Jumlah Makrofag dan Limfosit Usus Mencit Balb/c
(*Oral Administration of Mycobacterium Tuberculosis 38-kilodalton Adhesin Protein Increases Macrophages and Lymphocytes in Intestinal Balb/c Mice*)
Rahma Triliana, Ade A Kartosen, Dianika P Puspitasari, Sri Murwani, Sanarto Santoso, Maimun Z Arthamin 57-62
- Diazo Test as a Screening Test of Typhoid Fever: A Practical Approach
(*Uji Diazo sebagai Penyaring Demam Tifoid; Sebuah Pendekatan Praktis*)
J. Nugraha, Meiti Muljanti 63-66
- The Diagnostic Value of Heart-type Fatty Acid Binding Protein (h-FABP) Rapid Test Related to Cardiac Troponin I in Non ST Elevation Myocardial Infarction (Nstemi)
(*Nilai Diagnostik Uji Cepat Heart Type Fatty Acid Binding (h-FABP) Dihubungkan dengan Troponin I pada Non ST Elevation Myocardial Infarction (Nstemi)*)
E.R. Marpaung, Aryati, Sidarti Soehita SFHS, Yogiarto, Yusri 67-71
- Kadar Serum Kreatinin dan Kalium Pasien dengan dan Tanpa Diabetes Jenis (Tipe) II
(*The Creatinine Level and Potassium Serum in Patients with and without Type II Diabetic*)
Tonang Dwi Ardyanto, Tahono 72-75
- Prokalsitonin sebagai Penanda Pembeda Infeksi Bakteri dan Non Bakteri
(*Procalcitonin for the Differentiation of Bacterial and Non Bacterial Infection*)
Bastiana, Aryati, Dominicus Husada, MY. Probohoesodo 76-80
- Diagnosis Jangkitan (Infeksi) Virus Dengue dengan Uji Cepat (*Rapid Test*) IgA Anti-dengue
(*Diagnosis of Dengue Virus Infection with IgA Anti Dengue Rapid Tests*)
Sri Kartika Sari, Aryati 81-85
- Status Penggumpalan (Agregasi) Trombosit sebagai Faktor Prognostik Terjadinya Keluaran Klinis Strok Infark Mendadak (Strok Infark Akut)
(*The Platelet Aggregation Test as a Predictor of Clinical Outcome in Acute Infarction Stroke*)
Linda Rosita, Usi Sukorini, Budi Mulyono 86-96
- Hubungan antara *Flagging Atypdep* di Alat Cell-DYN 3200 dan Keberadaan *Plasmodium Spp* di dalam Darah Penderita di RSUD Dr. Soetomo Surabaya
(*Association Between Atypical Depolarization on the Cell-DYN 3200 and the Presence of Plasmodium Spp in Blood in the Dr. Soetomo Hospital Surabaya*)
Esti Rohani, J. Nugraha 97-101
- Korelasi antara Hitung Trombosit dengan Jumlah Cd4 Pasien HIV/AIDS
(*The Correlation between Thrombocyte and Cd4 Count in HIV/AIDS Patients*)
M.I. Diah Pramudianti, Tahono 102-106
- Pengaruh (Efek) Kemoterapi terhadap Kerja (Aktivitas) Enzim Transaminase di Penderita Kanker Payudara
(*The Chemotherapy Effect in the Activity of Transaminase Enzymes in Breast Cancer Patients*)
Helena Leppong, Mutmainnah, Ulang Bahrun 107-109

TELAAH PUSTAKA

Patogenesis dan Pemeriksaan Laboratoprium Mielofibrosis Primer (<i>Pathogenesis and Laboratory Examination of Primary Myelofibrosis</i>) Johanis, Arifoel Hajat	110–120
--	----------------

LAPORAN KASUS

Leukositosis Ber- <i>flagging</i> Bintang (*) Berpotensi Adanya Interferensi Alat Analisis Hematologi Otomatis (<i>Star (*)-flagged Leukocytosis as Indicator of Interfering Factor in Automatic Hematology Analyzer</i>) Christine Sugiarto, Leni Lismayanti, Nadjwa Zamalek Dalimoenthe	121–124
--	----------------

INFORMASI LABORATORIUM MEDIK TERBARU	125–126
--	----------------

DIAGNOSIS JANGKITAN (INFEKSI) VIRUS DENGUE DENGAN UJI CEPAT (RAPID TEST) IgA ANTI-DENGUE

(Diagnosis of Dengue Virus Infection With IgA Anti Dengue Rapid Tests)

Sri Kartika Sari, Aryati

ABSTRACT

Dengue IgM, IgG Capture ELISAs and NS1 Ag ELISA become the most widely used serological methods for dengue diagnosis until now. Previous studies reported a possible use of IgA antibodies for dengue virus as a new serologic marker to make dengue infection active. In the present study, the performance of IgA anti-dengue rapid test as a new marker of dengue infection was assessed. In this study, the sera were obtained from 30 dengue virus infection patients and 30 non dengue virus infection patients. Thirty dengue paired sera were collected twice, at the time of hospital admission (acute) and at discharge (convalescent). All sera samples were characterized using dengue reference ELISAs (NS1 Ag, Dengue IgM and IgG capture ELISAs). The results of IgA anti-dengue rapid test were compared with the corresponding dengue reference tests. The sensitivity and specificity of IgA anti-dengue rapid test respectively were 78.3% (95% CI: 65.5–87.5%), and 73.3% (95% CI: 55.6–85.8%). Meanwhile, from acute sera, sensitivity of IgA anti-dengue rapid test was 83.3% (95% CI: 64.5–93.7), higher than IgM (73.3%, 95% CI: 53.8–87.0), IgG (66.7%, 95% CI: 47.1–82.1) and NS1 Ag ELISAs (60%, 95% CI: 40.7–76.8). Positive IgA anti-dengue rapid test results in acute sera was higher in the secondary (91%) than primary infection (57%). IgA anti-dengue rapid test can be considered as a new marker for dengue infection, because it gives a high sensitivity, especially in the acute phase and in the secondary infections as well.

Key words: IgA anti-dengue rapid test, dengue virus infection

ABSTRAK

Hingga saat ini, pemeriksaan IgM dan IgG anti-dengue capture enzyme linked immunosorbent assay (ELISA), serta NS1 antigen ELISA digunakan secara luas sebagai penanda serologis infeksi virus dengue. Di telitian sebelumnya dilaporkan adanya kemungkinan penggunaan IgA antibodi sebagai penanda serologis untuk menemukan infeksi virus dengue. Penelitian ini menilai kinerja uji cepat (rapid test) IgA anti-dengue sebagai penanda infeksi dengue. Sampel penelitian terdiri dari 30 penderita infeksi virus dengue (IVD) dan 30 penderita non infeksi dengue. Sampel IVD diambil saat masuk rumah sakit dan keluar rumah sakit. Setiap sampel diperiksa IgA anti-dengue secara uji cepat, IgM/IgG anti-dengue dan NS1 Ag dengan cara (metode) ELISA. Sebagai baku emas digunakan IgM/IgG ELISA dan NS1 Ag ELISA. Kepekaan dan kekhasan IgA anti-dengue secara uji cepat masing-masing 78,3% (95% CI: 65,5–87,5%) dan 73,3% (95% CI: 55,6–85,8%), sedangkan kepekaan pada tahap akut 83,3% (95% CI: 64,5–93,7), lebih tinggi dibandingkan dengan IgM ELISA (73,3%, 95% CI: 53,8–87,0), IgG ELISA (66,7%, 95% CI: 47,1–82,1) dan NS1 Ag ELISA (60%, 95% CI: 40,7–76,8). Temuan IgA memberikan hasil positif lebih tinggi di infeksi sekunder (91%) dibandingkan di infeksi primer (57%). IgA anti-dengue secara uji cepat, dapat dipertimbangkan sebagai penanda baru infeksi dengue, mengingat kepekaannya yang tinggi, terutama pada tahap akut dan di infeksi sekunder.

Kata kunci: Uji cepat IgA anti dengue, infeksi virus dengue

PENDAHULUAN

Demam dengue merupakan infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, yang disebabkan oleh 4 jenis serum (serotipe) virus dengue, DEN-1, DEN-2, DEN-3 dan DEN-4.¹ Infeksi virus dengue menyebabkan masalah besar bagi kesehatan masyarakat karena diperkirakan setiap tahunnya menjadi penyebab 100.000.000 kasus demam dengue dan 250.000–500.000 kasus *Dengue Hemoragic Fever (DHF)/Dengue Shock Syndrome (DSS)*. Di banyak negara tropis yang merupakan daerah endemik, dengue yang sering menyebabkan wabah. Demam dengue ditandai dengan demam, sakit kepala, nyeri

otot dan sendi, bintik kemerahan dan adakalanya timbul gejala perdarahan. Gejala klinis yang tidak khas, mengharuskan uji diagnostik khas untuk membedakan dengue dengan penyakit lain, yang memberikan penampakan gejala yang sama, seperti leptospirosis, rubella, influenza, atau infeksi *rickettsia*.^{2,3}

Respon imun terhadap dengue beragam baik di infeksi primer dan infeksi sekunder serta antar perseorangan, sehingga beberapa teknik sering digunakan dalam gabungan untuk menetapkan kasus dengue tertentu. Tidak semua infeksi dapat ditemukan dengan imunoglobulin M (IgM), meskipun telah melewati beberapa hari setelah infeksi, sehingga

beberapa cara digunakan selain perubahan serum (serokonversi) IgM, seperti pada penemuan virus (*reverse transcription-PCR*) dan penemuan antigen dalam contoh tahap akut, serta pengukuran kadar larutan IgG dari sampel tahap akut dan konvalesen. Isolasi virus sulit dilakukan karena memerlukan angkutan dan penyimpanan contoh yang baik untuk melindungi RNA virus yang tidak tetap. Penentuan kadar larutan antibodi dengan ELISA atau dengan standar penghambat penggumpalan darah (*hemagglutination inhibition*) dapat digunakan, tetapi diagnosis dengan penentuan kadar larutan antibodi memerlukan sampel berpasangan, yang sering kali sulit didapatkan. Oleh karena itu, penemuan IgM dengan IgM tumpangan (*capture*) ELISA (MAC-ELISA) sampel tunggal, merupakan diagnostik yang tersering digunakan.³

Adanya imunoglobulin M khas dengue virus di penderita demam dengue akut bermanfaat untuk menemukan individu yang terinfeksi selama wabah penyakit. Namun, IgM dapat bertahan lama hingga lebih dari 8 bulan, sehingga, di daerah endemis demam dengue terdapat banyak jenis serum virus dengue, seperti Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan untuk menafsirkan hasil positif dari penderita dengan gejala demam sulit, karena ada IgM yang mungkin disebabkan oleh infeksi 8 bulan sebelumnya.¹

Terdapat laporan bahwa imunoglobulin A dan imunoglobulin M meningkat pada waktu yang sama di penderita demam dengue, tetapi berlangsung lebih singkat bila dibandingkan dengan imunoglobulin M.¹ Telitian sebelumnya didapatkan kemungkinan penggunaan antibodi IgA sebagai penanda (marker) serologis di infeksi yang aktif.¹⁻³ Koraka dan peneliti lainnya menemukan ada IgA yang lebih tinggi di penderita infeksi akut yang mengalami renjatan (syok) dibandingkan dengan penderita DF (*dengue fever*) atau DHF. Sehingga dapat dikatakan kadar IgA bernasab dengan beratnya penyakit.⁴ Berbagai telitian menunjukkan IgA sebagai penanda baru untuk infeksi virus dengue. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja diagnostik IgA *antidengue rapid test* (MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd).

METODE

Sampel penelitian ini adalah serum 30 penderita infeksi virus dengue (IVD) berdasarkan patokan WHO, yang dirawat di Ruang Tropik Anak RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dan serum 30 penderita demam non infeksi virus dengue. Pengambilan sampel di penderita IVD dilakukan 2 kali, yaitu saat masuk rumah sakit (masa sakit/akut) dan saat keluar rumah sakit (pulihan/konvalesen). Jumlah keseluruhan 87 sampel diperiksa IgM dan IgG *capture ELISAs* (Panbio Diagnostics., Australia), Platelia NS1 Ag ELISA (Bio-

rad), dan IgA *antidengue rapid test* (MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd).

Assure® Dengue IgA Rapid Test menggunakan asas uji cepat kebalan kromatografi (*immunochromatography rapid test*), digunakan untuk pemeriksaan IgA anti-dengue *rapid test* pada penelitian ini.

Cara kerja⁵: mula-mula 25 µl serum dimasukkan dalam sumuran persegi (*square well*), kemudian ditunggu hingga sampel mencapai garis penunjuk (indikator) berwarna biru, selanjutnya dimasukkan 3 tetes dapar penghalau (*chase buffer*) dalam sumuran lonjong (*oval well*), sengkeli bertanda (*marked tab*) "den IgA" ditarik hingga terasa ada tahanan, kemudian ditambahkan 1 tetes *chase buffer square well* setelah 20 menit hasilnya dibaca.

Gambar 1. Kit MP diagnostik Assure @Dengue IgA Rapid Test

Hasil yang didapatkan ditafsirkan oleh dua orang secara mandiri (*independen*) dan disahkan oleh pengawas.

Gambar 2. Interpretasi hasil Assure 2 Dengue IgA Rapid Test

Hasil pemeriksaan IgA anti-dengue *rapid test* dibandingkan dengan hasil IgM, IgG *capture ELISAs* dan NS1 Ag ELISA sebagai bakuan emas (*gold*

Tabel 1. Uji diagnostik IgM, IgG, NS1 dengue ELISA dan IgA *rapid test* di sampel penderita infeksi dengue dan non dengue

Jenis uji	Kepekaan (%)	Kekhasan (%)	PPV ^b (%)	NPV ^c (%)
IgA-RT	78,3 (65,5–87,5)	73,3 (55,6–85,8)	85,5 (73,8–92,4)	62,9 (46,3–76,8)
IgM ELISA	85,0 (72,9–92,5)	84,6 (64,3–95,0)	92,7 (81,6–97,6)	71,0 (51,8–85,1)
IgG ELISA	73,3 (60,1–83,5)	100 (84,0–100,0)	100 (90,0–100,0)	61,9 (45,6–76,0)
NS1 ELISA	41,7 (29,3–55,1)	96,3 (79,1–99,8)	96,2 (78,4–99,8)	42,6 (30,3–55,9)

95% CI, (confidence interval); ^b PPV, (positive predictive value); ^c NPV, (negative predictive value)

Tabel 2. Uji diagnostik IgM, IgG, NS1 Dengue ELISA dan IgA-RT pada tahap akut

Jenis uji	Kepekaan (%)	Kekhasan (%)	PPV ^b (%)	NPV ^c (%)
IgA-RT	83,3(64,5–93,7)	73,3(55,6–85,8)	75,8(59,0–87,2)	81,5(63,3–91,8)
IgM ELISA	73,3(53,8–87,0)	84,6(64,3–95,0)	84,6(64,3–95,0)	73,3(53,8–87,0)
IgG ELISA	66,7(47,1–82,1)	100(84,0–100,0)	100(80,0–100,0)	72,2 (54,6–85,2)
NS1 ELISA	60,0(40,7–76,8)	96,3(79,1–99,8)	94,7(71,9–99,7)	68,4(51,2–82,0)

95% CI, (confidence interval); ^b PPV, (positive predictive value); ^c NPV, (negative predictive value)

Tabel 3. Uji diagnostik IgM, IgG, NS1 dan IgA-RT pada tahapan pemulihan

Jenis uji	Kepekaan (%)	Kekhasan (%)	PPV ^b (%)	NPV ^c (%)
IgA-RT	73,3(53,8–87,0)	73,3(55,6–85,8)	73,3(55,6–85,8)	73,3(55,6–85,8)
IgM ELISA	96,7(80,9–99,8)	84,6(64,3–95,0)	87,9(70,9–96,0)	95,7(76,0–99,8)
IgG ELISA	80,0 (60,9–91,6)	100(84,0–100,0)	100(82,8–100,0)	81,3 (63,0–92,1)
NS1 ELISA	23,3(10,6–42,7)	96,3(79,1–99,8)	87,5(46,7–99,3)	53,1(38,4–67,2)

95% CI, (confidence interval); ^b PPV, (positive predictive value); ^c NPV, (negative predictive value)

standard). Kepekaan dan kekhasan IgA anti-dengue *rapid test* dianalisis menggunakan tabel 2 × 2 dengan selang kepercayaan (*confidence interval*) 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

60 sampel penderita infeksi dengue, hasil IgA *antidengue rapid test* IgA-RT adalah positif di 47 sampel dan negatif di 13 sampel. Sementara itu 30 sampel penderita non infeksi dengue, sebanyak 22 sampel menghasilkan IgA-RT negatif. Hasil uji diagnostik di 90 sampel penderita infeksi dengue dan non infeksi seperti tercantum di tabel 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan akut, 25 (83,3%) sampel penderita infeksi dengue menghasilkan IgA-RT positif, hanya 5 sampel yang hasilnya negatif, sedangkan pada tahapan konvalesen, hasil IgA-RT 22 (73,3%) sampel positif dan 8 sampel hasilnya negatif. Hasil IgM ELISA positif pada tahapan akut hanya 22 sampel (73,3%), IgG ELISA positif di 20 (66,7%) sampel, dan NS1 ELISA positif pada tahapan akut hanya 18 sampel (60,0%). (tabel 2.)

Sampel tahapan konvalesen, hasil IgA-RT yang positif sebanyak 22 sampel, dan 8 sampel negatif, sedangkan hasil IgM ELISA 29 sampel positif, IgG ELISA 24 sampel positif dan NS1 ELISA hanya 7 sampel yang positif. (tabel 3)

Dutra *et al.*, menyatakan bila angka banding IgM/IgG lebih dari 1,78 merupakan infeksi primer,

sedangkan bila kurang dari 1,78 merupakan infeksi sekunder.⁶ Pada penelitian ini, jumlah penderita infeksi dengue primer sebanyak 7 dan 23 penderita infeksi dengue sekunder. Pada tahapan akut infeksi primer perbandingan positif IgA-RT sama dengan IgG ELISA 57%, sedangkan di infeksi sekunder perbandingan positif IgA-RT paling tinggi dibandingkan dengan IgM, IgG, NS1 ELISA. Penemuan IgA memberikan hasil positif lebih tinggi di infeksi sekunder (91%) dibandingkan dengan di infeksi primer (57%). Di infeksi sekunder akut, temuan IgA-RT paling tinggi (91%) dibandingkan dengan IgG ELISA 87%, IgM ELISA 78%, dan NS1 ELISA 52%. Di gambar 3 tampak ELISA (42%), IgG ELISA (52,6%) dan NS1 ELISA (63,1), sedangkan pada hari 4–5, terjadi penurunan perbandingan positif IgA-RT menjadi 77,7%. Di IgM ELISA dan IgG ELISA mengalami peningkatan, masing-masing 92,6% dan 66,6 %.

Gambar 3. Grafik perbandingan positif IgM ELISA, IgG ELISA, NS1 ELISA dan IgA-RT infeksi sekunder (A) dan infeksi primer (B).

Tabel 4. Ciri sampel non infeksi virus dengue

No	Diagnosis	Jumlah sampel	Jumlah sampel positif IgA anti-dengue secara uji cepat (<i>rapid test</i>)
1	Malaria	10	4
2	<i>Typhoid fever</i>	9	1
3	Hepatitis A	5	2
4	Leptospirosis	2	1
5	Pneumonia dan Bronkopneumonia	3	0
6	Infeksi Saluran Kemih	1	0
Jumlah keseluruhan		30	8

Pada hari 1–3 persentase positif IgA-RT paling tinggi (94,7%) dibandingkan IgM.

Gambar 4. Grafik perbandingan positif IgA-RT, IgM ELISA, IgG ELISA dan NS1ELISA menurut hari permulaan serangan panas

Dari 30 sampel penderita non infeksi virus dengue, 8 sampel menunjukkan hasil positif (26,6%), dan 22 sampel negatif (73,3%). Dari 8 sampel dengan hasil IgA anti dengue *rapid test* positif, ada 4 sampel yang kulitnya menguning (ikterik). Sementara jumlah sampel yang kulitnya menguning sebanyak 7 sampel.

Infeksi virus dengue saat ini merupakan tantangan mendunia, mengingat pesatnya penyebaran virus dengue dalam 50 tahun terakhir. Penyebaran geografis, epidemi dengue yang timbul mendunia (*global emergence*) dan timbul kambuhan (*re-emergence*), keparahan penyakit, dengue menjadi masalah kesehatan dunia, terutama di wilayah perkotaan dan pinggiran (peri-urban) negara tropis dan subtropis. Ratusan dari ribuan kasus infeksi virus dengue yang dilaporkan tiap tahun tanpa penanganan yang baik, angka kematian dapat mencapai lebih dari 20%. Namun, dengan penanganan baik di rumah sakit dan pengobatan pendukung (terapi suportif), terutama pengobatan penggantian cairan (*fluid replacement therapy*) dan pengelolaan pemantauan (manajemen monitoring) penderita, angka kematian dapat diturunkan hingga kurang dari 1%. Patogenesis

infeksi virus dengue belum sepenuhnya diketahui, tetapi beberapa telitian epidemiologis menunjukkan tanggap kebalan (mengindikasikan respon imun) seseorang di infeksi sekunder yang disebabkan oleh virus dengue yang berbeda jenis serumnya, meningkatkan bahaya kejadian DHF dan DSS.⁷

Sebagian besar penderita infeksi virus dengue mengalami ketidaknyamanan hubungan lambung-usus (*gastrointestinal discomfort*), seperti mual, muntah dan murus (diare). Hal ini menunjukkan keterlibatan GALT, yaitu isotype antibodi dominan di tatanan kebalan selaput lendir (sistem imun mukosa) adalah IgA.⁸ Di samping itu, IgA merupakan antibodi yang terbanyak kedua di serum setelah IgG. Pada peredaran, IgA terdapat dalam bentuk monomer.⁹ IgM telah diketahui merupakan antibodi pertama yang dihasilkan sebagai respon imun humoral, dan IgM dapat digambarkan tanpa isotop pindahan (*switching isotope*) serta dihasilkan sebelum sel B mengalami hipermutasi somatik. IgA, yang memiliki bangun (struktur) monomer dan biasanya dihasilkan setelah perubahan golongan (*class switching*), akan memberikan daya gabung (afinitas) yang tinggi dan kemauan (aviditas) yang rendah terhadap antigen, sehingga lebih khas.⁷ Oleh karena itu perbandingan positif IgA lebih besar di infeksi sekunder dibandingkan dengan infeksi primer. Hal ini sesuai dengan hasil telitian ini, perbandingan hasil positif IgA-RT lebih besar di infeksi sekunder tahap mendadak 91,3% dan tahapan pemulihan 78,3% dibandingkan dengan infeksi primer tahap mendadak 57,1% dan tahapan pemulihan 57,1%. Balmaseda *et al*, menyatakan bahwa di infeksi sekunder, ada kemungkinan penemuan IgA lebih peka dibandingkan dengan IgM dalam serum.³

Kepekaan IgA-RT sebesar 78,3% sedangkan IgM ELISA 85%, IgG ELISA 73,3% dan NS1 Ag ELISA hanya 41,7%. Namun, di tahapan sakit mendadak, kepekaan IgA-RT paling tinggi sebesar 83,3% dibandingkan dengan IgM ELISA yang hanya 73,3%, IgG ELISA 66,7% dan NS1 ELISA 60%. di tahapan pemulihan, kepekaan IgM paling tinggi, dibandingkan dengan penanda yang lain. Karena kepekaan IgA-RT tinggi di tahapan sakit mendadak, maka hal ini berguna untuk diagnosis dini infeksi dengue. Penemuan dini penting di infeksi virus

dengue, mengingat keterlambatan diagnosis dapat menyebabkan tingginya angka kematian penderita tersebut. Antigen NS1 diketahui dihasilkan mulai hari pertama (1) mengalami demam hingga hari ke sembilan (9), tetapi biasanya tidak lebih dari 1 minggu. Walaupun kemungkinan beberapa penderita dapat ditemukan hingga setelah masa hilangnya demam (*defervescence*), penemuan antigen NS1 sampel tahapan sakit mendadak, kurang peka, terutama di infeksi sekunder.¹⁰ Hasil penelitian Andayani dkk, kepekaan NS1 Elisa beragam antara 27,8–52,2%. Hasil temuan IgA lebih baik bila dibandingkan dengan NS1 antigen.¹¹

Hasil telitian ini, IgA-RT paling tinggi pada hari pertama sampai dengan ketiga (ke-1–3) (94,7%), dan menurun pada hari keempat sampai dengan kelima (ke-4–5) (77,7%) dan semakin menurun pada hari keenam sampai dengan ketujuh (ke-6–7) (64,3%). Hasil telitian IgM ELISA perbandingan positif pada hari pertama sampai dengan ketiga (ke-1–3) hanya 42% dan pada hari keempat sampai dengan kelima (ke-4–5) mencapai 92,6%, hari ke-enam sampai dengan ketujuh (ke-6–7) mencapai 100%. Sedang Vazquez *et al*, menyatakan antibodi IgM dan IgA dalam serum ditemukan rerata pada hari 4,1 dan 4,8 hari setelah mulai sakit (*onset*).¹² Talarmin *et al*, menemukan IgA yang didapatkan rerata pada hari ke 4,6 lebih lambat satu (1) hari daripada IgM (hari ke-3,8). Di gambar 2 ditunjukkan bahwa IgA-RT dapat menemukan lebih awal daripada IgM, IgG dan NS1.

Kepekaan IgA cara uji cepat (78,3%) pada penelitian ini, lebih tinggi dibandingkan dengan IgG ELISA 73,3%. Hal ini berkaitan dengan temuan IgA yang lebih baik daripada IgG, baik untuk infeksi primer maupun sekunder. Sebanyak 12 sampel berasal dari infeksi primer. Di sampel infeksi primer, perbandingan positif IgA (tahapan sakit akut dan konvalesen masing-masing 57,1%) lebih besar daripada IgG ELISA (tahapan sakit akut 0%, tahapan konvalesen 14,3%). Di infeksi sekunder, perbandingan positif IgA (tahapan sakit akut 91,3%; tahapan konvalesen 78,3%) dan perbandingan IgG ELISA (tahapan sakit akut 87%, tahapan konvalesen 100%). Balmaseda *et al*.³ menyatakan rerata positif (*positive rate*) IgA dalam serum bermakna lebih tinggi di infeksi sekunder daripada yang primer. Hasil telitian ini pun menunjukkan rerata positif IgA lebih tinggi daripada IgG di infeksi sekunder daripada yang primer. Walaupun pada tahapan pemulihan, rerata positif IgA lebih rendah. Beberapa peneliti, Balmaseda *et al*, Guzman *et al*, menyatakan bahwa IgA lebih ditemukan saat tahapan sakit mendadak di infeksi sekunder.^{3,13} Sementara Koraka *et al*, menyatakan, IgA tidak dapat ditemukan di penderita DHF tahapan sakit mendadak (hari ke 2–4), tetapi kadarnya meningkat pada tahapan awal pemulihan (hari ke 5–14) dan menurun setelah hari ke 15. Dinyatakan pula oleh Koraka, penderita yang mengalami syok

menunjukkan ada peningkatan IgA bila dibandingkan dengan penderita DF/DHF⁴

Kepekaan IgA-RT dalam mendiagnosis infeksi dengue pada penelitian ini adalah sebesar 73,3%. Dari tujuh (7) sampel yang ikterik di penderita infeksi non dengue 4 (57,1%) diantaranya menunjukkan hasil IgA berdasarkan *rapid test* positif. Kemungkinan serum di sampel yang ikterik mempengaruhi hasil pemeriksaan *Assure® Dengue IgA Rapid Test* atau memang ada reaksi silang (*cross reaction*) dengan infeksi non dengue.

SIMPULAN

Dari hasil telitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Temuan IgA dengan *rapid test* berguna untuk mendeteksi infeksi baru, dan mempunyai kepekaan yang cukup baik. Di kedua infeksi sekunder temuan IgA lebih baik daripada IgM yang sering negatif di infeksi sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

1. Talarmin A, Labeau B, Lelarge J, Sarthou J. Immunoglobulin A-Specific Capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Diagnosis of Dengue Fever. *Journal of Clinical Microbiology* 2003; 36:5:1189–1192.
2. De Rivera IL, Parham L, Murillo W, Moncada W, Vazquez S. Humoral Immune Response of Dengue Hemorrhagic Fever Cases in Children from Tegucigalpa, Honduras. *The American Society of Tropical Medicine and Hygiene*. 2008; 79: 2:262–266.
3. Balmaseda A, et al. Diagnosis of Dengue Virus Infection by Detection of Specific Immunoglobulin M (IgM) and IgA Antibodies in Serum and Saliva. *J. Clin.Diag.Lab.Immunol*. 2003; 10:2:317–322.
4. Koraka P *et al*. Kinetic of dengue virus-specific serum immunoglobulin classes and subclasses correlate with clinical outcome of infection. *Journal of Clinical Microbiology*. 2001; 39: 4332–4338.
5. MP diagnostics ASSURE® Dengue IgA Rapid Test Instructions for Use MDV0011-2.
6. Dutra, et al. The Laboratory Diagnosis of Dengue : Application and Implications. *Journal of Global Infectious Disease*. 2009; 1: 38–44.
7. Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. WHO new edition, 2009.
8. MP Diagnostics. Advantage IgA Dengue Diagnostic Perspective. MP Biomedicals.
9. Kerr MA. The structure and function of human IgA. *J. Biochem*. 1990; 271: 285–296.
10. Alcon S, et al. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Specific to Dengue Virus Type 1 Nonstructural Protein NS1 Reveals Circulation of Antigen in the Blood during the Acute Phase of Disease in Patients Experiencing Primary or Secondary Infections. *J.Clin.Microb* 2002; 40: 376–381.
11. Aryati. Makalah Pendekatan Laboratorium Infeksi Virus Dengue untuk Diagnosis DBD, dipresentasikan pada Ceramah IDI Lombok Timur, 29 Mei 2010.
12. Vazquez S, et al. Kinetic of antibodies in sera, saliva, and urine samples from adult patients with primary or secondary dengue virus infections. *International Journal of Infectious Diseases* 2007; 11:256–262.
13. Guzman MG, et al. Dengue diagnosis, advances and challenges. *International Journal of Infectious Diseases* 2004; 8:69–80.